

Suomelle uusi vaaksiainen (Tipulidae) (TEKS 24.9.1986)

Nephrotoma relicta Savtshenko. Ks: Kuusamo, Oulanka 2.7.1985, 1 ♀. Henrik Bruun leg. Koska yksilö on naaras ei lajinmääritys ole aivan varma, vaan ky-symyksessä saattaa olla kuvaamatonkin laji (P. Oosterbroek, kirj. tieto); niinpä olisi tarpeellista saada koirasmateriaalia Suomesta. Lajin yleistuntomerkinä on keltaisuus, siivetkin ovat kellertävät; siiven pituus 13 mm. *N. relicta* tunnetaan lähinnä Suomea Inkeristä. Runsaammin lajia on tavattu SNTL:n itäosista.

Olavii Rautio

Allodia pyxidiiformis Zaitzev (Mycetophilidae) i Finland

Sedan gammalt har *Allodia ornaicollis* (Meigen) noterats från Finland. Det har emellertid visat sig att en stor del av materialet som gått under detta namn i själva verket tillhör den närstående *Allodia pyxidiiformis*. Tillsvidare har arterna noterats enligt följande: *Allodia ornaicollis* från Ab Runsala, N

Esbo, Ks Kuusamo; *Allodia pyxidiiformis* från N Esbo, Le Kilpisjärvi.

Gunnilla Ståhl

Agromyza demejerei Hendel, 1920 (Agromyzidae) Suomesta

U: Helsinki, Pukinmäki (668:38). 30.8.1986 löysin täysinkehittyneitä koverteita kultasadepensaan (*Laburnum* sp., ehkä *L. anagyroides*) lehdistä. Toukat tulivat ulos koverteista 31.8–1.9.1986 koteloitumista varten ja muuttuivat pian punaruskeiksi puparioiksi. Koverteiden ja toukkien ulkonäkö vastasi R.R. Askewin 1968, Trans. R. ent. Soc. Lond. 120(1), 1–37 ja K.A. Spencerin 1976, Fauna entomol. scand. 5(1), 103–104 kuvauksia.

Laji on Suomen faunalle uusi. Se tunnetaan mm. Hollannista ja Englannista missä se esiintyy viljelyllä *Laburnum anagyroides* Medic. pensaailla puistoissa ja puutarhoissa. Ruotsin eteläosista on useita löytöjä; pohjoisin on Upplannista.

Veli Vikberg